

Доктор физико-математических наук, профессор

К. Л. САМАРОВ,

кандидат физико-математических наук, доцент

С.С. САМАРОВА

ТРИГОНОМЕТРИЯ В ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Учебно-методическое пособие для школьников по математике

© К. Л. Самаров, С. С. Самарова 2012

Целью данного учебного пособия является помощь школьникам в подготовке к ЕГЭ по математике по разделу «Тригонометрия». В учебном пособии проводится анализ и даются решения типовых задач по тригонометрии, предлагаемых с 2007 года по 2012 год Московским институтом открытого образования в различных контрольных, диагностических, тренировочных, демонстрационных и экзаменационных работах по математике для школьников 10 и 11 классов.

Задача 1. Найдите множество значений функции

$$y = 2\cos 3x + 4.$$

Решение. Из неравенства

$$-1 \leq \cos t \leq 1, \quad t \in (-\infty; \infty)$$

в результате замены $t = 3x$ следует неравенство

$$-1 \leq \cos 3x \leq 1, \quad x \in (-\infty; \infty)$$

из которого получаем:

$$-1 \leq \cos 3x \leq 1 \Rightarrow -2 \leq 2\cos 3x \leq 2 \Rightarrow -2 + 4 \leq 2\cos 3x + 4 \leq 2 + 4 \Rightarrow 2 \leq 2\cos 3x + 4 \leq 6.$$

Ответ. $2 \leq y \leq 6$.

Похожая задача для самостоятельного решения.

Найдите множество значений функции

$$y = 2\cos 3x + 4.$$

Задача 2. Решите уравнение

$$\operatorname{tg} \frac{x}{7} = \frac{1}{7}.$$

Решение. $\operatorname{tg} \frac{x}{7} = \frac{1}{7} \Leftrightarrow \frac{x}{7} = \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \pi n, n \in Z \Leftrightarrow x = 7\operatorname{arctg} \frac{1}{7} + 7\pi n, n \in Z.$

Ответ. $7\operatorname{arctg}\frac{1}{7} + 7\pi n, n \in Z$

Похожие задачи для самостоятельного решения.

Решите уравнения:

1. $\operatorname{tg}\frac{x}{3} = \frac{1}{3},$

2. $\cos\frac{x}{6} = -1,$

3. $\sin\frac{x}{4} = 1,$

4. $2\sin\frac{x}{6} = \sqrt{3}.$

Задача 3. Решите уравнение

$$x^2 + 6x + 12 = \sqrt{\cos 2\pi x + 8}.$$

Решение. Преобразуем левую часть уравнения, выделяя полный квадрат:

$$x^2 + 6x + 12 = x^2 + 2 \cdot 3x + 9 + 3 = (x + 3)^2 + 3.$$

Следовательно, справедливо неравенство

$$(x + 3)^2 + 3 \geq 3,$$

причем знак равенства достигается в нем лишь при $x = -3$.

Рассматривая правую часть исходного уравнения, замечаем, что поскольку

$$\cos 2\pi x \leq 1,$$

то выполняется неравенство

$$\cos 2\pi x + 8 \leq 9.$$

Следовательно, справедливо неравенство

$$\sqrt{\cos 2\pi x + 8} \leq 3,$$

причем знак равенства достигается в нем лишь тогда, когда выполнено соотношение

$$\cos 2\pi x = 1.$$

Таким образом, при всех значениях переменной $x \in (-\infty; \infty)$ выполняется неравенство

$$x^2 + 6x + 12 \geq 3 \geq \sqrt{\cos 2\pi x + 8}. \quad (1)$$

Поскольку

$$\cos(2\pi \cdot (-3)) = 1,$$

то единственным случаем, когда в неравенстве (1) оба знака неравенства превращаются в знаки равенства, является случай $x = -3$. Следовательно, число $x = -3$ и является корнем исходного уравнения.

Ответ. -3 .

Похожая задача для самостоятельного решения.

Решите уравнение

$$x^2 - 16x + 67 = \sqrt{\sin \frac{\pi x}{16} + 8}$$

Задача 4. Решите уравнение

$$2^{x^2 - 4x + 6} = \cos \pi x + 3$$

Решение. Преобразуем левую часть уравнения, выделяя в квадратном трёхчлене полный квадрат:

$$2^{x^2-4x+6} = 2^{x^2-4x+4+2} = 2^{(x-2)^2+2} = 4 \cdot 2^{(x-2)^2}.$$

Поскольку

$$(x-2)^2 \geq 0,$$

то

$$2^{(x-2)^2} \geq 1,$$

и справедливо неравенство

$$4 \cdot 2^{(x-2)^2} \geq 4,$$

причем знак равенства достигается в нем лишь при $x = 2$.

Рассматривая правую часть исходного уравнения, замечаем, что поскольку

$$\cos \pi x \leq 1,$$

то выполняется неравенство

$$\cos \pi x + 3 \leq 4,$$

причем знак равенства достигается в нем лишь тогда, когда выполнено соотношение

$$\cos \pi x = 1.$$

Таким образом, при всех значениях переменной $x \in (-\infty; \infty)$ выполняется неравенство

$$2^{x^2-4x+6} \geq 4 \geq \cos \pi x + 3. \quad (2)$$

Поскольку

$$\cos(\pi \cdot 2) = 1,$$

то единственным случаем, когда в неравенстве (2) оба знака неравенства превращаются в знаки равенства, является случай $x = 2$. Следовательно, число $x = 2$ и является корнем исходного уравнения.

Ответ. 2.

Похожие задачи для самостоятельного решения.

Решите уравнения:

1. $5^{x^2-2x+2} = 4 - \cos \pi x$,
2. $7^{-3+4x-x^2} = 8 - \cos \pi x$.

Задача 5. Решите уравнение

$$4x^2 - 20x + 28 = (\sqrt{3} - \cos 3\pi x)(\sqrt{3} + \cos 3\pi x)$$

Решение. Преобразуем уравнение к следующему виду:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 20x + 28 &= (\sqrt{3} - \cos 3\pi x)(\sqrt{3} + \cos 3\pi x) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x^2 - 20x + 28 &= 3 - \cos^2 3\pi x \Leftrightarrow 4x^2 - 20x + 25 + \cos^2 3\pi x = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (2x - 5)^2 + \cos^2 3\pi x = 0. \end{aligned}$$

Поскольку

$$(2x - 5)^2 \geq 0, \quad \cos^2 3\pi x \geq 0,$$

то

$$(2x - 5)^2 + \cos^2 3\pi x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 5 = 0 \\ \cos 3\pi x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ \cos \frac{15\pi}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}.$$

Ответ. $\frac{5}{2}$.

Похожая задача для самостоятельного решения.

Решите уравнение:

$$4x^2 + 20x + 30 = (\sqrt{5} - \sin 2\pi x)(\sqrt{5} + \sin 2\pi x)$$

Задача 6. Решите уравнение

$$(2\sin x - 1)(\sqrt{-\cos x} + 1) = 0$$

Решение. Поскольку

$$\sqrt{-\cos x} \geq 0,$$

то

$$\sqrt{-\cos x} + 1 > 0.$$

Следовательно,

$$(2\sin x - 1)(\sqrt{-\cos x} + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2\sin x - 1 = 0, \\ -\cos x \geq 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2}, \\ \cos x \leq 0, \end{cases} \Leftrightarrow$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, & x_2 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \\ \cos x \leq 0, \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n.$$

Ответ. $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n$

Похожая задача для самостоятельного решения.

Решите уравнение:

$$(2\cos x + 1)(\sqrt{-\sin x} - 1) = 0$$

Задача 7. Решите уравнение

$$\frac{2\sin^2 x - 5\sin x - 3}{\sqrt{x + \frac{\pi}{6}}} = 0$$

Решение. Сначала выпишем область допустимых значений уравнения:

$$x > -\frac{\pi}{6}. \quad (3)$$

Теперь приравняем к нулю числитель дроби, стоящей в левой части уравнения:

$$\begin{aligned} 2\sin^2 x - 5\sin x - 3 = 0 &\Leftrightarrow (\sin x)_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 4 \cdot 3 \cdot 2}}{4} = \frac{5 \pm 7}{4} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\sin x)_1 = -\frac{1}{2}, (\sin x)_2 = 3. \end{aligned}$$

Поскольку, $-1 \leq \sin x \leq 1$, то уравнение

$$\sin x = 3$$

решений не имеет. Решая уравнение

$$\sin x = -\frac{1}{2},$$

получаем:

$$\sin x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x_1 = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad x_2 = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

В силу неравенства (3) отсюда получаем:

$$\begin{aligned} x_1 &= -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad n > 0, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ x_2 &= \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \geq 0, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ответ. $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n > 0, n \in \mathbb{Z}; \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n \geq 0, n \in \mathbb{Z}.$

Похожая задача для самостоятельного решения.

Решите уравнение:

$$\frac{2\cos^2 x + 5\cos x - 3}{\sqrt{x - \frac{\pi}{3}}} = 0$$

Задача 8. Решите уравнение

$$\frac{4\cos^2 x + 8\sin x - 7}{\sqrt{-\operatorname{tg} x}} = 0$$

Решение. Приравняем к нулю числитель дроби, стоящей в левой части уравнения, и воспользуемся основным тригонометрическим тождеством:

$$\begin{aligned} 4\cos^2 x + 8\sin x - 7 = 0 &\Leftrightarrow 4(1 - \sin^2 x) + 8\sin x - 7 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 4 - 4\sin^2 x + 8\sin x - 7 = 0 \Leftrightarrow 4\sin^2 x - 8\sin x + 3 = 0. \end{aligned}$$

Теперь решим полученное уравнение:

$$\begin{aligned} 4\sin^2 x - 8\sin x + 3 = 0 &\Leftrightarrow (\sin x)_{1,2} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 3 \cdot 4}}{8} = \frac{8 \pm 4}{8} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\sin x)_1 = \frac{1}{2}, (\sin x)_2 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Поскольку, $-1 \leq \sin x \leq 1$, то уравнение

$$\sin x = \frac{3}{2}$$

решений не имеет. Решая уравнение

$$\sin x = \frac{1}{2},$$

получаем

$$\sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x_1 = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \quad x_2 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (4)$$

Поскольку каждое решение исходного уравнения должно удовлетворять неравенству

$$-\operatorname{tg} x > 0 \Leftrightarrow \operatorname{tg} x < 0,$$

то первая серия корней в формулах (4) должна быть отброшена.

Ответ. $\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

Похожие задачи для самостоятельного решения

1. Решите уравнение:

$$\frac{-4\sin^2 x + 8\cos x + 7}{\sqrt{\operatorname{ctg} x}} = 0$$

2. Найдите корни уравнения

$$2\cos^2 x + \sqrt{3}\cos x = 0,$$

удовлетворяющие неравенству $\sin x < 0$.

Задача 9. Решите уравнение

$$\sqrt{\cos^2 x - \sin^2 x} (\operatorname{tg} 2x - 1) = 0$$

Решение. Поскольку

$$\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x;$$

$$\operatorname{tg} 2x = \frac{\sin 2x}{\cos 2x},$$

то исходное уравнение можно переписать в виде:

$$\sqrt{\cos^2 x - \sin^2 x} (\operatorname{tg} 2x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \operatorname{tg} 2x = 1, \\ \cos 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (2x)_1 = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, & (2x)_2 = \frac{5\pi}{4} + 2\pi n, & n \in Z \\ \cos 2x > 0 \end{cases}$$

Так как вторая серия корней не удовлетворяет условию $\cos 2x > 0$, то она должна быть отброшена. Следовательно,

$$(2x)_1 = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in Z \Leftrightarrow x_1 = \frac{\pi}{8} + \pi n, n \in Z.$$

Ответ. $\frac{\pi}{8} + \pi n, n \in Z.$

Похожие задачи для самостоятельного решения.

Решите уравнения:

1. $\sqrt{\sin x \cdot \cos x} \left(\frac{1}{\operatorname{tg} 2x} + 1 \right) = 0,$
2. $(\operatorname{tg}^2 x - \sqrt{3} \operatorname{tg} x) \sqrt{-5 \cos x} = 0.$

Задача 10. Решите уравнение

$$\cos \left(\frac{3\pi}{2} + 2x \right) = \cos x.$$

Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi \right]$

Решение. Воспользовавшись формулой приведения

$$\cos \left(\frac{3\pi}{2} + 2x \right) = \sin 2x,$$

преобразуем уравнение:

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2} + 2x\right) = \cos x \Leftrightarrow \sin 2x = \cos x.$$

Решим полученное уравнение:

$$\begin{aligned} 2\sin x \cos x - \cos x &= 0 \Leftrightarrow \cos x(2\sin x - 1) = 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \cos x = 0 \cup 2\sin x - 1 = 0 &\Leftrightarrow \cos x = 0 \cup \sin x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x_1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, x_2 = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n, x_3 = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, x_4 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in Z. \end{aligned}$$

Теперь найдем все значения $n \in Z$, при которых числа

$$x_1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, x_2 = \frac{3\pi}{2} + 2\pi n, x_3 = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, x_4 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in Z$$

будут лежать на отрезке $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$. Для этого заметим, что при $n < 0, n \in Z$

все числа x_1, x_2, x_3, x_4 будут отрицательными, и, конечно же, не смогут попасть в указанный отрезок. Также заметим, что в указанный отрезок не попадают числа x_1, x_2, x_3, x_4 , у которых $n = 0$, а также числа, у которых $n \geq 2, n \in Z$. Остаётся выяснить, где располагаются числа x_1, x_2, x_3, x_4 , у которых $n = 1$, т.е. числа

$$x_1 = \frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{5\pi}{2}, x_2 = \frac{3\pi}{2} + 2\pi = \frac{7\pi}{2}, x_3 = \frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{13\pi}{6}, x_4 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi = \frac{17\pi}{6}.$$

Легко видеть, что из этих чисел на отрезок $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$ попадают числа

x_1, x_2, x_4 , а число x_3

не попадает.

Ответ. $\frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{17\pi}{6}$.

Похожие задачи для самостоятельного решения.

1.	Решите уравнение	$4\sin^2 x - 12\sin x + 5 = 0.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$[-\pi; 2\pi]$
2.	Решите уравнение	$\log_5(\cos x - \sin 2x + 25) = 2.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$
3.	Решите уравнение	$\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2} = \cos 2x.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$
4.	Решите уравнение	$\cos^2 x - \frac{1}{2}\sin 2x + \cos x = \sin x.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right]$
5.	Решите уравнение	$2\sin 2x = 4\cos x - \sin x + 1.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$

6.	Решите уравнение	$-11\cos\left(-\frac{16\pi}{61}\right) - 54\sin\left(\frac{12\pi}{13}\right) + \cos 2x -$ $-\cos\left(x - \frac{5\pi}{2}\right) - 1 =$ $= -11\cos\left(-\frac{16\pi}{61}\right) - 54\sin\left(\frac{12\pi}{13}\right).$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$
7.	Решите уравнение	$\sin x + \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right)\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}\right) = 0.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$
8.	Решите уравнение	$\sin 2x - 2\sqrt{3}\cos^2 x - 4\sin x + 4\sqrt{3}\cos x = 0.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$
9.	Решите уравнение	$\cos 2x = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[-\frac{5\pi}{2}; -\pi\right]$
10	Решите уравнение	$\operatorname{tg} x + \cos\left(\frac{3\pi}{2} - 2x\right) = 0.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[-\pi; \frac{\pi}{2}\right]$
11	Решите уравнение	$\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right).$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие	$\left[\pi; \frac{5\pi}{2}\right]$

			жащие от- резку	
12	Решите уравнение	$2\cos^2 x + 2\sin 2x = 3.$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$
13	Решите уравнение	$4\sin^3 x = 3\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right).$	Укажите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку	$\left[\frac{7\pi}{2}; \frac{9\pi}{2}\right]$

Задача 11. Найти все решения уравнения

$$\left|\cos x - \frac{1}{4}\right| = 8\cos^2 \frac{x}{2} - 5$$

на отрезке $[-\pi; \pi]$

Решение. Воспользовавшись формулой

$$\cos^2 \frac{x}{2} = \frac{1 + \cos x}{2},$$

преобразуем уравнение:

$$\begin{aligned} \left|\cos x - \frac{1}{4}\right| = 8\cos^2 \frac{x}{2} - 5 &\Leftrightarrow \left|\cos x - \frac{1}{4}\right| = 8\left(\frac{1 + \cos x}{2}\right) - 5 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left|\cos x - \frac{1}{4}\right| = 4\cos x - 1. \end{aligned}$$

Таким образом, исходное уравнение принимает вид

$$\left| \cos x - \frac{1}{4} \right| = 4 \cos x - 1. \quad (5)$$

Для того, чтобы решить уравнение (5), рассмотрим два случая.

Случай 1.

$$\cos x - \frac{1}{4} \geq 0 \Leftrightarrow \cos x \geq \frac{1}{4}.$$

В этом случае

$$\left| \cos x - \frac{1}{4} \right| = \cos x - \frac{1}{4},$$

и уравнение (5) принимает вид:

$$\cos x - \frac{1}{4} = 4 \cos x - 1 \Leftrightarrow 3 \cos x = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{4}.$$

Следовательно, в случае 1

$$x = \pm \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Случай 2.

$$\cos x - \frac{1}{4} < 0 \Leftrightarrow \cos x < \frac{1}{4}.$$

В этом случае

$$\left| \cos x - \frac{1}{4} \right| = -\cos x + \frac{1}{4},$$

и уравнение (5) принимает вид:

$$-\cos x + \frac{1}{4} = 4 \cos x - 1 \Leftrightarrow 5 \cos x = \frac{5}{4} \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{4}.$$

Следовательно, в случае 2 уравнение решений не имеет.

Таким образом, осуществляется только случай 1, и корни исходного уравнения определяются по формуле

$$x = \pm \arccos \frac{1}{4} + 2\pi n, n \in Z.$$

Из этого множества корней только числа

$$\arccos \frac{1}{4} \quad \text{и} \quad -\arccos \frac{1}{4}$$

лежат на отрезке $[-\pi; \pi]$

Ответ. $\pm \arccos \frac{1}{4}.$

Задача 12. Найдите значение выражения

$$5 \cos \left(\frac{5\pi}{2} + \alpha \right),$$

если $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2} \right).$

Решение. Воспользовавшись формулой приведения, получим

$$5 \cos \left(\frac{5\pi}{2} + \alpha \right) = -5 \sin \alpha.$$

Поскольку $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2} \right)$, то $\sin \alpha < 0$. Следовательно,

$$\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{4}{5} \right)^2} = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}.$$

Поэтому

$$-5 \sin \alpha = (-5) \cdot \left(-\frac{3}{5} \right) = 3.$$

Ответ. 3.

Похожие задачи для самостоятельного решения.

1.	Найдите значение выражения	$15\sin^2 x - 8,$	если	$\cos^2 x = 0,6$
2.	Найдите значение выражения	$5\cos^2 x + 1,$	если	$\sin^2 x = 0,6$
3.	Найдите значение выражения	$4 + 5\operatorname{tg}^2 x \cdot \cos^2 x,$	если	$\sin x = \frac{1}{\sqrt{5}}$
4.	Найдите значение выражения	$7 - 6\operatorname{tg}^2 x \cdot \cos^2 x,$	если	$\sin x = \frac{1}{\sqrt{6}}$
5.	Найдите значение выражения	$26\sin \alpha,$	если	$\cos \alpha = \frac{12}{13},$ $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$
6.	Найдите значение выражения	$13\cos \alpha,$	если	$\sin \alpha = \frac{12}{13},$ $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$
7.	Найдите значение выражения	$\cos \alpha,$	если	$\sin \alpha = -\frac{3\sqrt{11}}{10},$ $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$
8.	Найдите значение выражения	$\sin \alpha,$	если	$\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5},$ $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$
9.	Найдите значение	$9\cos^2 \alpha,$	если	$\operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{\frac{4}{11}}.$

	выражения			
10.	Найдите значение выражения	$21\sin^2 \alpha,$	если	$\operatorname{tg} \alpha = \sqrt{\frac{3}{11}}.$
11.	Найдите значение выражения	$-13\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right),$	если	$\cos \alpha = \frac{12}{13},$ $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$
12.	Найдите значение выражения	$\operatorname{tg} \alpha,$	если	$\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5},$ $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$
13.	Найдите значение выражения	$26\cos\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right),$	если	$\cos \alpha = \frac{12}{13},$ $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

Задача 13. Вычислите значение выражения

$$8\sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}.$$

Решение. Воспользовавшись формулой «Синус двойного угла», получим

$$8\sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} = 4 \cdot 2 \cdot \sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12} = 4\sin \frac{5\pi}{6} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

Ответ. 2.

Задача 14. Вычислите значение выражения

$$\sqrt{12} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - \sqrt{3}$$

Решение. Воспользовавшись формулой «Косинус двойного угла», получим

$$\begin{aligned}\sqrt{12} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - \sqrt{3} &= \sqrt{12} \cdot \frac{1 + \cos \frac{5\pi}{6}}{2} - \sqrt{3} = \sqrt{3} + \sqrt{3} \cos \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3} = \\ &= \sqrt{3} \cos \frac{5\pi}{6} = \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

Ответ. $-\frac{3}{2}$.

Задача 15. Вычислите значение выражения

$$3 - \frac{\sin 37^\circ \sin 53^\circ}{\sin 74^\circ}$$

Решение. Воспользовавшись одной из формул приведения и формулой «Синус двойного угла», получим

$$\begin{aligned}3 - \frac{\sin 37^\circ \sin 53^\circ}{\sin 74^\circ} &= 3 - \frac{\sin 37^\circ \sin (90^\circ - 37^\circ)}{\sin 74^\circ} = 3 - \frac{\sin 37^\circ \cos 37^\circ}{\sin 74^\circ} = \\ &= 3 - \frac{\sin 37^\circ \cos 37^\circ}{2 \sin 37^\circ \cos 37^\circ} = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.\end{aligned}$$

Ответ. $\frac{5}{2}$.

Задача 16. Вычислите значение выражения

$$\log_4 \left(\sin \frac{5\pi}{12} \cdot \sin \frac{5\pi}{6} \cdot \sin \frac{11\pi}{12} \right)$$

Решение. Воспользовавшись формулой приведения и формулой «Синус двойного угла», получим

$$\begin{aligned}\sin \frac{5\pi}{12} \cdot \sin \frac{5\pi}{6} \cdot \sin \frac{11\pi}{12} &= \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{12} \right) \cdot \sin \frac{\pi}{6} \cdot \sin \frac{\pi}{12} = \\ &= \cos \frac{\pi}{12} \cdot \sin \frac{\pi}{6} \cdot \sin \frac{\pi}{12} = \frac{1}{2} \cdot \sin \frac{\pi}{6} \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{8}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\log_4 \left(\sin \frac{5\pi}{12} \cdot \sin \frac{5\pi}{6} \cdot \sin \frac{11\pi}{12} \right) = \log_4 \left(\frac{1}{8} \right) = \frac{1}{2} \log_2 (2^{-3}) = -\frac{3}{2} \log_2 2 = -\frac{3}{2}.$$

Ответ. $-\frac{3}{2}$.

Задачи для самостоятельного решения похожие на задачи 13, 14, 15,

16.

1.	Вычислите значение выражения	$\frac{10 \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4}}{\sqrt{6}}$
2.	Вычислите значение выражения	$\frac{6 \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6}}{\sqrt{6}}$
3.	Вычислите значение выражения	$\cos \frac{\pi}{3} + \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4}$
4.	Вычислите значение выражения	$\left(\sin \frac{\pi}{12} - \cos \frac{\pi}{12} \right)^2 - 1$
5.	Вычислите значение выражения	$\sqrt{3} \left(2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{3} \right)$
6.	Вычислите значение выражения	$\sqrt{3} - \sqrt{12} \sin^2 \frac{\pi}{12}$
7.	Вычислите значение выражения	$\frac{14}{\sin \left(-\frac{29\pi}{6} \right) \cos \left(\frac{32\pi}{3} \right)}$
8.	Вычислите значение выражения	$4 \sin 30^\circ \cdot \operatorname{tg} 45^\circ + \cos 60^\circ \cdot \operatorname{ctg} 90^\circ$
9.	Вычислите значение выражения	$\log_4 \left(\cos \frac{\pi}{12} \cdot \cos \frac{5\pi}{3} \cdot \cos \frac{5\pi}{12} \right)$

10.	Вычислите значение выражения	$\log_2 \cos \frac{5\pi}{12} + \log_2 \cos \frac{\pi}{3} + \log_2 \cos \frac{\pi}{12}$
11.	Вычислите значение выражения	$\sqrt[3]{\sin \frac{7\pi}{12} \cdot \sin \frac{5\pi}{6} \cdot \sin \frac{11\pi}{12}}$
12.	Вычислите значение выражения	$10 \sin 30^\circ \cos 120^\circ$
13.	Вычислите значение выражения	$\frac{36 \sin 23^\circ \cos 23^\circ}{\sin 46^\circ}$
14.	Вычислите значение выражения	$5 - \frac{\sin 86^\circ}{\cos 43^\circ \cos 47^\circ}$

Задача 17. Сколько целочисленных решений имеет неравенство

$$\frac{x^2 + 2x - 8}{\sqrt{\sin \frac{\pi x}{2}}} \leq 0?$$

Решение. Найдем корни квадратного трёхчлена, стоящего в числителе дроби и разложим квадратный трёхчлен на множители:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 8 = 0 &\Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 32}}{2} \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-2 \pm 6}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x_1 = -4, x_2 = 2 \Rightarrow x^2 + 2x - 8 = (x + 4)(x - 2) \end{aligned}$$

Заметим, что стоящее в знаменателе дроби выражение

$$\sqrt{\sin \frac{\pi x}{2}}$$

положительно. Поэтому исходное неравенство можно преобразовать к следующему виду:

$$\frac{x^2 + 2x - 8}{\sqrt{\sin \frac{\pi x}{2}}} \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 2x - 8 \leq 0, \\ \sin \frac{\pi x}{2} > 0, \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x+4)(x-2) \leq 0, \\ \sin \frac{\pi x}{2} > 0, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-4; 2], \\ \sin \frac{\pi x}{2} > 0. \end{cases}$$

Теперь рассмотрим все целые числа, лежащие на отрезке $[-4; 2]$:

$$-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2.$$

При этом

$$\sin \frac{\pi \cdot (-4)}{2} = 0, \sin \frac{\pi \cdot (-3)}{2} = 1, \sin \frac{\pi \cdot (-2)}{2} = 0,$$

$$\sin \frac{\pi \cdot (-1)}{2} = -1, \sin \frac{\pi \cdot (0)}{2} = 0, \sin \frac{\pi \cdot (1)}{2} = 1, \sin \frac{\pi \cdot (2)}{2} = 0.$$

Таким образом, только 2 числа из целых чисел, лежащих на отрезке $[-4; 2]$, удовлетворяют условию

$$\sin \frac{\pi x}{2} > 0.$$

Ответ. 2.

Похожие задачи для самостоятельного решения.

Сколько целочисленных решений имеет неравенство

1. $\frac{20 + x - x^2}{\sqrt{\cos \frac{\pi x}{2}}} \geq 0?$

2. $\frac{12 - x - x^2}{\sin^2 \frac{\pi x}{2}} \geq 0?$

Задача 18. Найдите все пары чисел x и y , для которых

$$5\cos^2 x + 5y^2 + 8y\cos x + 2\cos x - 2y + 2 = 0.$$

Решение. Перепишем это уравнение в форме

$$5\cos^2 x + (8y + 2)\cos x + 5y^2 - 2y + 2 = 0, \quad (6)$$

и будем рассматривать уравнение (6) как квадратное уравнение относительно переменной $\cos x$, коэффициенты которого зависят от переменной y . Тогда дискриминант квадратного уравнения (6) будет иметь вид:

$$\begin{aligned} D &= (8y + 2)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (5y^2 - 2y + 2) = 64y^2 + 32y + 4 - 100y^2 + 40y - 40 = \\ &= -36y^2 + 72y - 36 = -36(y^2 - 2y + 1) = -36(y - 1)^2. \end{aligned}$$

Заметим, что при всех значениях переменной y , за исключением $y = 1$, дискриминант уравнения (6) отрицателен, а лишь в случае $y = 1$ дискриминант равен нулю. Поэтому уравнение (6) будет иметь корни только лишь при $y = 1$. Подставляя значение $y = 1$ в уравнение (6), получим:

$$\begin{aligned} 5\cos^2 x + 10\cos x + 5 = 0 &\Leftrightarrow 5(\cos^2 x + 2\cos x + 1) = 0 \Leftrightarrow 5(\cos x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Ответ.
$$\begin{cases} x = \pi + 2\pi n, & n \in \mathbb{Z}, \\ y = 1. \end{cases}$$

Похожая задача для самостоятельного решения.

Найдите все пары чисел x и y , для которых

$$4x^2 + 2\sin^2 y + 4x\sin y + 4x + 2 = 0$$

Задача 19. Какое из чисел

$$\operatorname{tg} \frac{9\pi}{19}, \operatorname{tg} \frac{15\pi}{19}, \operatorname{tg} \frac{21\pi}{19}, \operatorname{tg} \frac{27\pi}{19}$$

является положительным?

Решение. Заметим, что

$$0 < \frac{9\pi}{19} < \frac{\pi}{2}, \quad \frac{\pi}{2} < \frac{15\pi}{19} < \pi, \quad \pi < \frac{21\pi}{19} < \frac{3\pi}{2}, \quad \pi < \frac{27\pi}{19} < \frac{3\pi}{2}.$$

Поэтому

$$\operatorname{tg} \frac{9\pi}{19} > 0, \quad \operatorname{tg} \frac{15\pi}{19} < 0, \quad \operatorname{tg} \frac{21\pi}{19} > 0, \quad \operatorname{tg} \frac{27\pi}{19} > 0.$$

Ответ. $\operatorname{tg} \frac{9\pi}{19}, \operatorname{tg} \frac{21\pi}{19}, \operatorname{tg} \frac{27\pi}{19}.$

Похожие задачи для самостоятельного решения.

1. Какое из чисел

$$\operatorname{tg} \frac{9\pi}{17}, \operatorname{tg} \frac{15\pi}{17}, \operatorname{tg} \frac{21\pi}{17}, \operatorname{tg} \frac{27\pi}{17}$$

является положительным?

2. Какое из чисел

$$\sin \frac{12\pi}{7}, \sin \frac{10\pi}{7}, \sin \frac{8\pi}{7}, \sin \frac{6\pi}{7}$$

является наибольшим?

3. Какое из чисел

$$\cos \frac{8\pi}{5}, \cos \frac{9\pi}{5}, \cos \frac{12\pi}{5}, \cos \frac{13\pi}{5}$$

является наибольшим?

4. Какое из чисел

$$\sin 0,2; \sin 1,6; \sin \pi; \sin 4$$

является наименьшим?

Задача 20. Найдите производную функции

$$y = 4\operatorname{tg} x - x^7$$

Решение. По формулам дифференцирования

$$y' = \frac{4}{\cos^2 x} - 7x^6$$

Ответ. $\frac{4}{\cos^2 x} - 7x^6$

Похожая задача для самостоятельного решения.

Найдите производную функции

$$y = x^6 + 5\operatorname{tg} x$$

Задача 21. Найдите значение производной функции

$$y = 3x + 4\sin x$$

при $x = -\frac{\pi}{3}$,

Решение. По формулам дифференцирования

$$y' = 3 + 4\cos x$$

Поэтому

$$y'\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 3 + 4\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = 3 + 4 \cdot \frac{1}{2} = 5.$$

Ответ. 5.

Похожая задача для самостоятельного решения.

Найдите значение производной функции

$$y = 6\cos x - 5x$$

при $x = -\frac{\pi}{6}$

Задача 22. Найдите все значения x , при которых выражения

$$\frac{\cos(\pi + 2x) - 3}{\sqrt{-\sin x}}$$

и

$$\frac{\sin\left(\frac{9\pi}{2} - x\right) - 2}{\sqrt{-\sin x}}$$

принимают разные значения.

Решение. Воспользовавшись формулами приведения и формулой «Косинус двойного угла», получим

$$\frac{\cos(\pi + 2x) - 3}{\sqrt{-\sin x}} = \frac{-\cos 2x - 3}{\sqrt{-\sin x}} = \frac{-(2\cos^2 x - 1) - 3}{\sqrt{-\sin x}} = \frac{-2\cos^2 x - 2}{\sqrt{-\sin x}};$$

$$\frac{\sin\left(\frac{9\pi}{2} - x\right) - 2}{\sqrt{-\sin x}} = \frac{\sin\left(4\pi + \frac{\pi}{2} - x\right) - 2}{\sqrt{-\sin x}} = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2}{\sqrt{-\sin x}} = \frac{\cos x - 2}{\sqrt{-\sin x}}.$$

По условию задачи

$$\frac{-2\cos^2 x - 2}{\sqrt{-\sin x}} \neq \frac{\cos x - 2}{\sqrt{-\sin x}} \Leftrightarrow \left(\frac{-2\cos^2 x - 2}{\sqrt{-\sin x}}\right) - \left(\frac{\cos x - 2}{\sqrt{-\sin x}}\right) \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2\cos^2 x - \cos x}{\sqrt{-\sin x}} \neq 0 \Leftrightarrow \frac{2\cos^2 x + \cos x}{\sqrt{-\sin x}} \neq 0 \Leftrightarrow \frac{\cos x(2\cos x + 1)}{\sqrt{-\sin x}} \neq 0,$$

Следовательно,

$$\begin{cases} \cos x \neq 0 \\ \cos x \neq -\frac{1}{2} \\ \sin x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad x \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ x \neq \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad x \neq -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ \sin x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-\pi + 2\pi n; 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}, \\ x \neq -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad x \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

Ответ. $\begin{cases} x \in (-\pi + 2\pi n; 2\pi n), \quad n \in \mathbb{Z}, \\ x \neq -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, \quad x \neq -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \end{cases}$

Похожая задача для самостоятельного решения.

Найдите все значения x , при которых выражения

$$\frac{\cos 2x + 3}{\sqrt{-\sin x}}$$

и


$$\frac{\sin\left(\frac{3\pi}{2} + x\right) + 2}{\sqrt{-\sin x}}$$

принимают разные значения.

Задача 23. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 15$, $\cos B = \frac{3}{5}$.

Найдите AC .

Решение.



Из определения косинуса острого угла найдём BC (рис.1):

$$\cos B = \frac{BC}{AB} = \frac{BC}{15} = \frac{3}{5} \Rightarrow BC = 9.$$

С помощью теоремы Пифагора найдём AC :

$$AC = \sqrt{AB^2 - BC^2} = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12.$$

Ответ. 12.

Похожие задачи для самостоятельного решения.

1. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC = 6$, $\operatorname{tg} A = \frac{\sqrt{2}}{4}$. Найдите AB .
2. В равнобедренном треугольнике ABC сторона AC – основание, $\cos A = \frac{5}{13}$, высота BH равна 24. Найдите AC .
3. В параллелограмме $ABCD$ высота, опущенная на сторону AB , равна 6, $\cos A = \frac{2}{7}$. Найдите AD .
4. В параллелограмме $ABCD$ высота, опущенная на сторону AB , равна 18, $\sin A = \frac{3}{8}$. Найдите AD .

Задача 24. Найдите наименьшее значение функции

$$y = 5 \sin x + \frac{36}{\pi} x + 6$$

на отрезке $\left[-\frac{\pi}{6}; 0\right]$.

Решение. Сначала найдем производную функции:

$$y' = 5 \cos x + \frac{36}{\pi}.$$

Далее заметим, что

$$\cos x \geq -1, \quad \pi < 4,$$

откуда вытекает неравенство:

$$y' > -5 + \frac{36}{4} = -5 + 9 = 4.$$

Таким образом, производная функции везде положительна, а, значит, функция везде возрастает. Отсюда следует, что наименьшее значение функции на отрезке достигается в левом конце отрезка, т.е. в точке

$$x = -\frac{\pi}{6}.$$

Поэтому

$$y_{\min} = 5 \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \frac{36}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{6}\right) + 6 = -\frac{5}{2} - 6 + 6 = -\frac{5}{2}.$$

Ответ. $-\frac{5}{2}$.

Задача 25. Найдите наибольшее значение функции

$$y = 4\sqrt{2} \sin x - 4x + \pi$$

на отрезке $[0; \pi]$

Решение. Сначала найдем производную функции:

$$y' = 4\sqrt{2} \cos x - 4.$$

Теперь найдем корни производной, т.е. те значения x , в которых производная обращается в нуль:

$$\begin{aligned} 4\sqrt{2} \cos x - 4 = 0 &\Leftrightarrow 4\sqrt{2} \cos x = 4 \Leftrightarrow \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Заметим, что из этих корней только точка $x = \frac{\pi}{4}$ лежит на отрезке $[0; \pi]$, и сравним значения функции в трёх точках

$$x = 0, \quad x = \frac{\pi}{4}, \quad x = \pi.$$

Поскольку

$$\begin{aligned} y(0) &= \pi, \\ y\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 4\sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) - 4 \cdot \left(\frac{\pi}{4}\right) + \pi = 4 - \pi + \pi = 4, \\ y(\pi) &= 4\sqrt{2} \sin \pi - 4 \cdot \pi + \pi = -3\pi, \end{aligned}$$

то самым большим из этих чисел является число 4, откуда вытекает, что наибольшее значение функции достигается в точке

$$x = \frac{\pi}{4},$$

и равно 4.

Ответ. 4.

Похожие задачи для самостоятельного решения.

1.	Найдите наименьшее значение функции	$y = 3\sin x + \frac{30}{\pi}x + 4$	на отрезке	$\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$
2.	Найдите наименьшее значение функции	$y = 5 + \frac{2\pi\sqrt{3}}{3} - 2x\sqrt{3} - 4\cos x$	на отрезке	$\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$
3.	Найдите наименьшее значение функции	$y = 2\cos x - 2x - 5$	на отрезке	$[-\pi; 0]$
4.	Найдите наименьшее значение функции	$y = 8\operatorname{tg}x - 8x - 2\pi + 5$	на отрезке	$\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$
5.	Найдите наименьшее значение функции	$y = 16\operatorname{tg}x - 16x - 4\pi + 7$	на отрезке	$\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$
6.	Найдите наибольшее значение функции	$y = 14\cos x + 7x\sqrt{3} - \frac{7\pi\sqrt{3}}{3} + 6$	на отрезке	$\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$
7.	Найдите наибольшее значение функции	$y = 12\operatorname{tg}x - 12x + 3\pi - 6$	на отрезке	$\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$
8.	Найдите наибольшее значение функции	$y = 14\operatorname{tg}x - 14x + \frac{7\pi}{2} + 4$	на отрезке	$\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$
9.	Найдите наибольшее значение функции	$y = 2\cos x + x\sqrt{3} - \frac{\pi\sqrt{3}}{3}$	на отрезке	$\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$

Задача 26. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + \sin^2 y} - 2 = \sin y, \\ 2\cos y = x. \end{cases}$$

Решение. Заметив, что правая часть первого уравнения системы неотрицательна, возведем первое уравнение системы в квадрат:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 + \sin^2 y - 2} = \sin y, \\ 2 \cos y = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + \sin^2 y - 2 = \sin^2 y, \\ 2 \cos y = x, \\ \sin y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2 = 0, \\ 2 \cos y = x, \\ \sin y \geq 0 \end{cases}$$

Далее получаем

$$\begin{aligned} \begin{cases} x^2 - 2 = 0 \\ 2 \cos y = x \\ \sin y \geq 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ 2 \cos y = x \\ \sin y \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ 2 \cos y = x \\ \sin y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ \cos y = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin y \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ \cos y = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ \sin y \geq 0 \end{cases} \cup \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ y = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ \sin y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases} \cup \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ y = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases} \end{aligned}$$

Ответ. $\begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}; \begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ y = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$

Задача 27. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 + 3x - \sqrt{x^2 + 3x - 1} = 7, \\ 2\sqrt{2} \sin y = x. \end{cases}$$

Решение. Сначала решим первое уравнение системы. Для этого перепишем его в виде

$$x^2 + 3x - 1 - \sqrt{x^2 + 3x - 1} - 6 = 0$$

и совершим замену переменного

$$\sqrt{x^2 + 3x - 1} = t.$$

В результате получим квадратное уравнение

$$t^2 - t - 6 = 0,$$

обладающее корнями

$$t_1 = 3, t_2 = -2.$$

Поскольку t – неотрицательное число, то второй корень должен быть отброшен.

Следовательно,

$$\begin{aligned} t = 3 \Rightarrow \sqrt{x^2 + 3x - 1} = 3 &\Leftrightarrow x^2 + 3x - 1 = 9 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -5, x_2 = 2. \end{aligned}$$

Рассмотрим первый случай:

$$\begin{cases} x = -5, \\ 2\sqrt{2} \sin y = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5, \\ \sin y = -\frac{5}{2\sqrt{2}} \end{cases}$$

Поскольку

$$-\frac{5}{2\sqrt{2}} < -1,$$

то в первом случае решений нет.

Рассмотрим второй случай:

$$\begin{cases} x = 2, \\ 2\sqrt{2} \sin y = x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ \sin y = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2, \\ y = (-1)^n \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ. $\begin{cases} x = 2, \\ y = (-1)^n \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$

Похожие задачи для самостоятельного решения.

Решить систему уравнений

1.	$\begin{cases} \sqrt{x^2 + \cos^2 y - 3} = \cos y, \\ 2 \sin y = x. \end{cases}$
2.	$\begin{cases} \sqrt{\cos y} \sqrt{6x - x^2 - 8} = 0, \\ \sqrt{\sin x} \sqrt{2 - y - y^2} = 0. \end{cases}$
3.	$\begin{cases} 2 \cos 2x + 3 \sin x = 1, \\ y^2 \cos x + y \cos x + \frac{\sqrt{15}}{2} = 0. \end{cases}$
4.	$\begin{cases} \frac{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}{\sqrt{y}} = 0, \\ y - \cos x = 0. \end{cases}$
5.	$\begin{cases} \frac{2 \sin^2 x + 3 \sin x + 1}{\sqrt{-y}} = 0, \\ y = -\cos x. \end{cases}$
6.	$\begin{cases} \frac{16^{\sin x} - 6 \cdot 4^{\sin x} + 8}{\log_2(1 - 2y)} = 0, \\ y = \cos x. \end{cases}$
7.	$\begin{cases} \frac{81^{\cos x} - 12 \cdot 9^{\cos x} + 27}{\log_7(1 + 2y)} = 0, \\ y = \sin x. \end{cases}$
8.	$\begin{cases} \frac{\sin 2x - \cos x}{\sqrt{y + 1}} = 0, \\ y = 4 \sin x - 3. \end{cases}$

9.	$\begin{cases} \frac{\sin 2x + \cos x}{\sqrt{y-1}} = 0, \\ y = 4 \sin x + 3. \end{cases}$
10.	$\begin{cases} \sin x - \sin y = 1, \\ \sin^2 x + \cos^2 y = 1. \end{cases}$
11.	$\begin{cases} (2x^2 - 5x - 3)\sqrt{\cos y} = 0, \\ \sin y = x. \end{cases}$
12.	$\begin{cases} 2 \sin^2 x - 5 \sin x = 0, \\ \sqrt{6y} - 2 \cos x = 0. \end{cases}$
13.	$\begin{cases} 3 \sin^2 x + 7 \sin x = 0, \\ \sqrt{15y} - 5 \cos x = 0. \end{cases}$
14.	$\begin{cases} y + \sin x = 0, \\ (4\sqrt{\sin x} - 1)(2y + 3) = 0. \end{cases}$
15.	$\begin{cases} y - \sin x = 0, \\ (3\sqrt{\sin x} - 1)(y - 5) = 0. \end{cases}$
16.	$\begin{cases} x \operatorname{tg} y = 9, \\ x \operatorname{ctg} y = 3. \end{cases}$
17.	$\begin{cases} y \operatorname{ctg} x = -9, \\ y \operatorname{tg} x = -3. \end{cases}$
18.	$\begin{cases} y^2 = x, \\ \sin y^2 = \cos x. \end{cases}$
19.	$\begin{cases} \left(\frac{36}{25}\right)^{\operatorname{tg} x} + \left(\frac{6}{5}\right)^{\operatorname{tg} x} - 2 = 0, \\ \sqrt{15y} - 5 \cos x = 0. \end{cases}$